2010年内科护理:糖尿病的神经病变护士资格考试 PDF转换 可能丢失图片或格式,建议阅读原文 https://www.100test.com/kao\_ti2020/0/2021\_2022\_2010\_E5\_B9\_B4 E5 86 85 c21 129.htm 糖尿病并发神经性病变比较常见,自 觉症状多。 糖尿病并发神经性病变比较常见,自觉症状多。 (I) 周围神经病变: 远端肢体感觉障碍。下肢比上胶重, 呈对称性,这是最常见的症状之一。突出表现为两下肢麻木 , 伴有针刺样及烧灼样感觉异常, 有时难忍受, 夜间加重, 有的呈自发性闷电痛或刀割样痛。检查时四肢远端有"手套 型"、"袜套型"分布的感觉障碍。50%的病例可见肌肉萎 缩,多发生在大腿部。远端胶体运动障碍。起病急,多伴 有肌无力、肌萎缩。上肢的臂丛神经、正中神经最常受累, 下肢以股神经、闭孔神经、坐骨神经的损害较多见。 本文来 源:百考试题网(2)颅神经病变:多出现眼肌麻痹症状,其 中以动眼神经不全麻痹为最常见,可能与局部缺血及糖尿病 引起的血管病变有关。 (3) 脑部病变:在脑血管中,缺血 性脑血管病比出血性脑血管病常见。 本文来源:百考试题网 (4)脊髓病变:较少见,又称糖尿病性脊髓痨。特点为走路 不稳,如踩棉花感觉,容易跌跤。(5)植物神经病变:相 当常见且复杂多变。 约有20%的糖尿病人有血管运动神经 障碍、体位性低血压、下肢浮肿、皮肤温度低、两足发凉等 症状,受寒后症状加重。约有60的糖尿病人合并胃肠功能 紊乱,糖尿病性腹泻和吸收不良综合征,不伴有腹痛及感染 表现。有人认为是由于影响了内脏植物神经功能所致。 并 发泌尿生殖系统功能障碍也相当常见。多数为无张力性膀腕 ,表现为排尿费力、排尿不尽和尿潴留。常合并有阳痿、早

泄、逆行射精和不育。 排汗功能常受影响,出汗异常。最常见的是两下肢及躯体下半身出汗少或不出汗,而头部及上半身多汗,尤其在吃饭时面部大汗淋漓。 更多信息请访问:百考试题护士网校 护士论坛 护士在线题库 百考试题执业护士加入收藏相关推荐:2010年内科护理:糖尿病足伤口的护理100Test 下载频道开通,各类考试题目直接下载。详细请访问www.100test.com