

2010年儿科护理：新生儿常见症状抽搐护士资格考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/0/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E5_84_BF_c21_133.htm 全身性抽搐较少见，常为皮层下发作，表现为阵发性瞬目、眼球转动或震颤及口颊部抽动等。多见于：（一）中枢神经系统疾病 颅内出血、脑膜炎、核黄疸及脑发育畸形等。百考试题 - 全国最大教育类网站(www.Examda.com)（二）破伤风 常于出生后4~6天出现，伴牙关紧闭、抽搐、角弓反张等。（三）代谢紊乱 低钙血症，出生一周内出现烦躁不安、惊跳、震颤、屏气、喉痉挛医学教育网搜集整理以至惊厥；低血糖，多见于早产儿、小样儿、过期产儿、母亲患有糖尿病等，于出生后数小时至一周内出现震颤、阵发性紫绀、反应迟钝、厌食、哭声弱及体温不升等。更多信息请访问：百考试题护士网校 护士论坛 护士在线题库 百考试题执业护士加入收藏相关推荐：2010年儿科护理：新生儿溶血病的概述 2010年儿科护理：新生儿溶血病的诊断要点 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com