

2010年儿科护理：新生儿窒息的主要病因护士资格考试 PDF
转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao_ti2020/0/2021_2022_2010_E5_B9_B4](https://www.100test.com/kao_ti2020/0/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E5_84_BF_c21_138.htm)

[_E5_84_BF_c21_138.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/0/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E5_84_BF_c21_138.htm) 新生儿出生后一分钟只有心跳而无呼吸者或未建立规律呼吸的缺氧状态，称为新生儿窒息。（一）胎儿窘迫的继续 凡是引起胎儿窘迫的原因未经纠正，均可引起新生儿窒息。采集者退散（二）呼吸道阻塞 在产程延长过程中，胎儿吸入羊水、粘液和血液引起呼吸道阻塞。（三）颅内损伤 由于缺氧、滞产或产钳术等可使胎头受压而引起颅内出血。采集者退散（四）镇静剂、麻醉剂的应用 在胎儿娩出前4小时内使用吗啡或巴比妥类药物，或产程中使用乙醚深度麻醉，可抑制新生儿呼吸中枢。更多信息请访问：百考试题护士网校 护士论坛 护士在线题库 百考试题执业护士加入收藏相关推荐：2010年儿科护理：新生儿窒息的主要表现
2010年儿科护理：新生儿溶血病的诊断要点 100Test 下载频道
开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com