

2010年外科护理：低渗性缺水的分度护士资格考试 PDF转换
可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/0/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E5_A4_96_c21_144.htm 根据缺钠程度，低渗性缺水可分为三度：1.轻度缺钠病人感疲乏、头晕、手足麻木，口渴不明显。尿中Na⁺减少。血清钠在135mmol/L以下，每公斤体重缺氯化钠0.5g。采集者退散 2.中度缺钠除上述症状外，尚有恶心、呕吐，脉搏细速，血压不稳定医学教|育网搜集整理或下降，脉压变小，浅静脉萎陷，视力模糊，站立性晕倒。尿量少，尿中几乎不含钠和氯。血清Na⁺在130mmol/L以下，每公斤体重缺氯化钠0.5~0.75g。百考试题论坛 3.重度缺钠病人神志不清，肌痉挛性抽痛，肌腱反射减弱或消失；出现木僵，甚至昏迷。常发生休克。血清Na⁺在120mmol/L以下，每公斤体重缺氯化钠0.75~1.25g。更多信息请访问：百考试题
护士网校 护士论坛 护士在线题库 百考试题执业护士加入收藏
相关推荐：2010年外科护理：高渗性缺水的概述 2010年外科
护理：慢性胃炎临床表现 100Test 下载频道开通，各类考试题目
直接下载。详细请访问 www.100test.com