

2010年内科护理：胃癌的实验室和其他检查护士资格考试

PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/0/2021_2022_2010_E5_B9_B4

[_E5_86_85_c21_186.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/0/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E5_86_85_c21_186.htm) 实验室检查 1.血液检查约近半数患者有缺铁性贫血，是长期失血所致。血沉增快。血清癌胚抗原（CEA）检测仅供参考，特异性不强。 2.大便隐血试验 常持续阳性，检测方便，有辅助诊断的意义。来源：考试大 3.胃液分析已不列为常规，虽2/3进展期胃癌患者可以无酸或低胃酸分泌，但正常人亦可呈低胃酸，故诊断意义不大。 X线钡餐检查来源：www.100test.com 是诊断胃癌重要方法之一。采用气钡双重造影或多角度摄影能提高阳性率。癌瘤直径小于1cm难以发现，故对早期胃癌诊断率低。 X线征象有充盈缺损，癌性龛影、皮革胃和胃潴留等表现。 胃镜检查百考试题 - 全国最大教育类网站(www . Examda. com) 是检查早期胃癌最重要手段。可直接进行观察、摄影，并能在直视下冲洗、尼龙刷摩擦或活检，进行细胞学检查，对早期胃癌的诊断率有明显提高。 超声胃镜检查 80年代中后期发展起来的超声胃镜具有内镜与超声波双重功能，大大增加了内镜的诊断功能。对于肉眼不清楚的早期胃癌，即癌灶局限于粘膜下层，粘膜表面没有明显的形态和色泽改变者，用超声胃镜有无可比拟的优点。 更多信息请访问：百考试题护士网校 护士论坛 护士在线题库 百考试题执业护士加入收藏相关推荐：2010年内科护理：胃癌的诊断与鉴别诊断 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com