

2010年内科护理：中风类别和症状护士资格考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/0/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E5_86_85_c21_268.htm

1. 短暂性脑缺血：是颈动脉短暂性血液供应不足的现象，原因是过度疲劳、惊恐、暴怒等，也可能在过度兴奋或吃饭时发生，表现为突发，几分钟至几个小时的局部神经功能缺失，多数会在24小时内完全恢复，但会有反复发作的可能性。

2. 脑梗塞：是指局部脑组织，包括神经细胞、胶质细胞和血管，由于缺乏血液供应而坏死。脑梗塞分为脑血栓和脑栓塞两类，都属于缺血性中风，与高血压、糖尿病、心脏病等疾病有关，表现为偏瘫、说话困难、抽搐等，速度很快，在数秒钟内症状发展到高峰。脑栓塞的起病年龄不一，由于多数与心脏病尤其是风湿性心脏病有关，所以发病年龄以中青年居多。采集者退散

3. 脑出血：由于脑内的动脉、静脉和毛细血管的坏死、破裂导致的脑部出血，其中以动脉最为常见。情绪激动，过分兴奋、过度用力或脑力紧张，甚至休息或睡眠时都可能发生脑出血。表现为头部剧烈疼痛、随即频频呕吐、接着意识逐渐模糊、常在几分钟或几十分钟内昏迷、呼吸深沉且带有鼾声、面色潮红或苍白、全身大汗淋漓、大小便失禁、血压升高、偶尔出现抽搐等。必须注意的是，如果病人的脉搏转为快速、体温升高、血压下降，则会有生命的危险。更多信息请访问：百考试题护士网校 护士论坛 护士在线题库 百考试题执业护士加入收藏相关推荐：2010年内科护理：预防中风的饮食原则 2010年内科护理：中风饮食治疗原则 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com