

2010年基础护理学辅导：精神分裂症复发的常见原因护士资格考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/0/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E5_9F_BA_c21_274.htm

1.目前的治疗属于对症治疗，不能从根本上消除导致精神分裂症的原因。 2.疾病本身的客观因素，如病前性格缺陷（如内向、孤僻，不善于与别人交往等）；家族遗传史（家族里有人有类似的疾病）；急性期治疗不及时或者治疗得不彻底，导致残留症状。尤其是阴性症状如淡漠、退缩等。 3.抗精神疾病药物的不良反应使患者不能坚持服药；患者及家属对精神分裂症的认识不足，对坚持服药预防复发的重要性认识不足；患者及家属误听不当的停药或减量建议，如社会上一部分人偏激地认为，长期服用抗精神疾病药会使人变呆变傻。 4.有的是过分地关注和保护患者，减少了患者与社会的接触，使患者复发率大大增加。研究表明，与配偶共同生活的患者复发率较低，而离婚和独身者复发率较高。被朋友、邻居和家庭歧视，工作机会减少会使患者病情加重。 更多信息请访问：百考试题护士网校 护士论坛 护士在线题库 百考试题执业护士加入收藏 相关推荐：2010年基础护理学辅导：康复期精神分裂症患者常见问题 2010年基础护理学辅导：影响精神分裂症预后的因素 100Test 下载频道 开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com