

2010年内科护理：脑血栓病人的化验检查护士资格考试 PDF
转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/0/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E5_86_85_c21_277.htm

为了疾病的诊断和鉴别诊断，并了解其他系统、器官的功能状况，以及对于病因的分析、病情的判断、治疗方案的确立、预后的估计等，通常做以下项目的化验：

(1) 三大常规：

血常规。脑血栓发病初期，一般无特殊变化。白细胞不高，这一点就与脑出血不同。当合并感染时，如呼吸系统或泌尿系统感染，则白细胞增高。百考试题论坛

尿常规。脑血栓对尿常规并无影响。当病人有肾小动脉硬化并存时，尿常规可有异常。有慢性前列腺炎的男病人，尿中可有脓球、蛋白。尿糖检查可发现既往症状不显的糖尿病患者。

大便常规。一般无变化，脑血栓病人检查大便的目的，是为了发现寄生虫和其他肠道疾病。大便潜血以发现胃肠道的出血。百考试题 - 全国最大教育类网站(www.Examda.com)

(2) 血生化检查：

血糖测定和糖耐量试验：可发现糖尿病患者和糖耐量低下病人。糖尿病与动脉粥样硬化关系密切，是脑血管病的危险因素。研究发现，脑血管病急性期，无论出血性或缺血性，有中数病人糖耐量低下。缺血性脑血管病不论在短暂脑缺血发作期间、急性期及恢复期均常有糖耐量低下，而且持续地存在。而在糖耐量低下的脑血管病人中，凝血因子VIII相关抗原、纤维蛋白原、甘油三酯显著高于正常，血液存在高凝状态，是促发脑血管病的原因之一。

血脂测定：脂质代谢异常与动脉硬化有直接关系，沉积在粥样硬化内皮下层的脂质，主要是胆固醇。血中胆固醇 >1.43 毫摩尔/升、 β -脂蛋白 >5 克/升是诊断动脉

硬化的能考。甘油三酯和高密度脂蛋白（HDL）呈相反关系，即甘油三酯增高时HDL降低。HDL降低易促发动脉粥样硬化，引起缺血性脑血管病。采集者退散 肝肾功能测定：本病不影响肝功。GPT、HBsAg通过检查以了解有无肝脏病。肾功一般正常，如有肾小动脉硬化、糖尿病并发肾损害、慢性肾盂炎等存在，肾功能异常。 血清钾、钠、氯、二氧化碳结合力的检查：及时发现电解质紊乱及酮钍 獾那榭觥

? www.Examda.CoM考试就到百考试题（3）脑脊液检果：病后即作腰空，一般脑脊液压力不高，外观清晰透明，细胞数、蛋白绝大多数属正常。（4）其他：特殊需要的化验检查，由医生酌情而定。更多信息请访问：百考试题护士网校 护士论坛 护士在线题库 百考试题执业护士加入收藏相关推荐：2010年内科护理：营养不良引起神经衰弱 2010年内科护理：躯体病为神经衰弱潜因 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com