

2010年内科护理：高血压病人的眼底变化护士资格考试 PDF  
转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/0/2021\\_2022\\_2010\\_E5\\_B9\\_B4\\_E5\\_86\\_85\\_c21\\_278.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/0/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E5_86_85_c21_278.htm)

高血压病后期所并发的心、脑、肾等病变所造成的严重后果已被人们所熟知，但高血压病和眼睛之间有什么关系，可能了解的不多。通过检眼镜可以观察高血压病人的眼底情况，通过眼底变化可知高血压动脉硬化的程度。也就是说，随着病情进展，眼底情况也恶化，会造成双目失明。高血压早期视网膜动脉功能性收缩变细，如果此时血压得到控制，血管即可恢复正常。长期血压升高会使血管硬化和管壁增厚，此时视网膜动脉失去透明性，支脉呈黄红色反光，像铜丝一样，称为铜丝动脉；如果病情继续发展则血色银丝状，称为银线动脉。百考试题论坛 如果血压长期升高，由于动脉管壁硬化增厚失去透明性，使位于动脉之下的静脉也就看不清楚了。来源：考试大 如果血压急剧升高，就会导致视网膜血管破裂、血液渗出，造成视网膜水肿；如果出血量或渗出量较多可造成剥离。此时若得不到有效治疗，可致失明。高血压早期若血压得到满意控制，视网膜病变可逐渐恢复，但长期高血压病人或已发生动脉硬化病人很难恢复正常，并可引起视乳头缺血、水肿、视力下降，严重者可导致视神经萎缩，也可造成失明。更多信息请访问：百考试题护士网校 护士论坛 护士在线题库 百考试题执业护士加入收藏相关推荐：2010年内科护理：脑血栓病人的化验检查  
2010年内科护理：躯体病为神经衰弱潜因 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)