

2010年内科护理：如何才能达到目标血压护士资格考试 PDF
转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/0/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E5_86_85_c21_280.htm

由于高血压治疗的目的是保护心脑血管肾，那么血压降到多少才能达到这个要求呢？一些专家进行长期观察与研究后发现，当血压控制在收缩压一百四十毫米汞柱、舒张压在九十毫米汞柱以下时，心脑血管疾病的发病率才最低。有糖尿病的高血压患者，血压还应该控制得更低一些，一般应小于收缩压一百三十毫米汞柱、舒张压八十五毫米汞柱。有高血压肾功能损害的患者，血压应该控制在收缩压在一百二十五至一百三十毫米汞柱以下、舒张压在七十五至八十毫米汞柱以下，才能延缓肾功能损害的发展。如果应用三种降压药物后，血压仍不能控制在收缩压一百四十毫米汞柱、舒张压在九十毫米汞柱以下时，可能有如下原因：病人饮食中食盐过多，饮食量过大，吸烟或服用其它药物

。 www.Examda.CoM 考试就到百考试题 抗高血压药物选择不合理。有一些引起高血压疾病尚未诊断出来。“白大衣高血压”。来源：考试大的美女编辑们对于血压控制不下来的患者应要找医生分析原因，针对上述情况，做相应的处理。如果血压不能控制，应合理调整降压药物，在医生指导下可几类药物联合应用并合理调整利尿剂应用。更多信息请访问：[百考试题护士网校](#) [护士论坛](#) [护士在线题库](#) [百考试题执业护士](#) 加入收藏相关推荐：2010年内科护理：高血压病人的眼底变化 2010年内科护理：导致高血压的主要原因 100Test 下载频道 开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com