

2010年内科护理：脑血栓形成的家庭应急处理护士资格考试
PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/0/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E5_86_85_c21_282.htm

脑血栓形成 (cerebral thrombosis) 是指由于脑动脉硬化等引起脑血流缓慢形成血栓而使周围脑组织缺血，从而发生缺血性脑梗塞 (cerebral infarction) 等临床症状的脑血管意外。 [病因] (1) 动脉粥样硬化，最常见病因之一。(2) 动脉内膜炎。百考试题论坛 (3) 高血凝状态如妊娠、产后、术后、服用避孕药物等。(4) 血液粘稠度增高如脱水、高脂血症等。 [临床表现] 发病前多有头痛、头晕、手足麻木等先兆，常在休息或睡眠中发生肢体瘫痪、失语、复视等症状，昏迷少见。 [诊断要点] (1) 多为老年人，一般为60岁以上。来源：考试大 (2) 发病前常有头痛、头晕、手足麻木等先兆症状。(3) 发病多在休息或睡眠中，可有肢体瘫痪、失语、复视等症状。(4) 脑脊液检查时压力不高，无色透明，有时镜下仅有少许红细胞。 [家庭应急处理] www.Examda.CoM 考试就到百考试题 (1) 病人应平卧休息，给予营养丰富、多维生素及易消化食物饮食。(2) 呕吐时，应将口腔内容物及时清除。(3) 保护瘫痪肢体，避免擦伤。(4) 多翻身和肢体早期作被动运动，以防肌挛缩和恢复肌力。(5) 尽早送往医院治疗。更多信息请访问：百考试题护士网校 护士论坛 护士在线题库 百考试题执业护士加入收藏相关推荐：2010年内科护理：脑梗死病人标准护理计划 2010年内科护理：导致高血压的主要原因 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com