

2010年内科护理：注射胰岛素者如何加餐护士资格考试 PDF  
转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/0/2021\\_2022\\_2010\\_E5\\_B9\\_B4\\_E5\\_86\\_85\\_c21\\_307.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/0/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E5_86_85_c21_307.htm) 对于胰岛功能差每日需3或4次RI注射的糖尿病患者来说，在胰岛素作用很强以前的时刻，如上午9~10时，下午3时及晚间睡前应酌情加餐；使用PZI或PZI RI混合液时，晚上睡前加餐很重要；在体力活动增加时应在开始体力活动时加餐。一般每次加餐主食25g左右。另外加餐时应注意以下两点：来源：考试大的美女编辑们 不要单纯进食肉类蛋类食品，应适当进食些碳水化合物，若碳水化合物摄取过少会引起饥饿性酮症。www.Examda.CoM考试就到百考试题 加餐不要超过总热量的需要，因为热量过高会引起肥胖，肥胖使体内组织对胰岛素的敏感性降低，因而胰岛素的需要量增多，病情难以控制。更多信息请访问：百考试题护士网校 护士论坛 护士在线题库 百考试题执业护士加入收藏相关推荐：2010年内科护理：注射胰岛素查四次四段尿 2010年内科护理：怎样调整胰岛素的剂量 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)