

2010年外科护理：椎动脉型颈椎病的鉴别诊断护士资格考试
PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/0/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E5_A4_96_c21_332.htm (-) 内耳综合征 (美尼尔综合征)

常突然发作，为四周景物或自身在旋转或摇晃的错觉，发作刺激性（如光线、情绪波、动等）加重；严重时常伴有恶心呕吐、面色苍白、出汗多等迷走神经症状；发作时间持续，多在1~3天内逐渐缓解，为反复发作，间歇期一般无症状。来源：考试大（二）良性阵发性眩晕常为外伤、耳病、年老、噪音性损伤及使用链霉素过敏，使内耳椭圆囊的耳石变性、移位（地心引力作用）所致。鉴别：常见50~60岁妇女；睁眼作体位查出位置性（3~6秒钟后出现）眼球震颤；病检为良性，可有复发。更多信息请访问：百考试题护士网校 护士论坛 护士在线题库 百考试题执业护士加入收藏相关推荐：2010年外科护理：椎动脉型颈椎病的康复治疗
100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问
www.100test.com