

2010年内科护理：局限性脑梗死的治疗护士资格考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/0/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E5_86_85_c21_34.htm 一般治疗 积极治疗高血压病、糖尿病、高脂血症； 在起病急性期要保持呼吸道通畅、吸氧、防止感染，不宜迅速降压，可逐步调整至160/95mmHg (1kPa = 7.5mmHg) ； 适当补充液体和营养，避免大量输入葡萄糖，因为高血糖可扩大梗死区域； 来源：考试大的美女编辑们 加强护理，防止并发症，感染时应用有效和足量抗生素治疗。 抗血栓治疗 来源：考试大的美女编辑们 抗血小板聚集剂，常用药为阿司匹林； 抗凝剂，可选用肝素； 溶栓剂，溶栓剂的使用应争取在梗塞后6小时之内进行，对有出血性病史或出血性梗塞者禁用。 用药有组织纤维蛋白溶酶原激活剂、链激酶和尿激酶。 扩容疗法 常用低分子右旋糖酐，每日500ml，连用7~14日，稀释血液、降低血粘度，但对心功能不全患者要慎用。 降低颅内压 常用20% 甘露醇250ml，30分钟内滴完，以脱水、抗脑水肿，但要注意心功能。 还可用速尿及地塞米松，但激素要少用。 脑血管扩张剂 百考试题 - 全国最大教育类网站(www.Examda.com) 可增加脑血流量，改善脑缺血。 但急性期不宜应用。 其他 中药清开灵有清热解毒、镇静安神之作用，可静脉输入。 其他还有复方丹参注射液、川芎嗪注射液也常应用于本病。 还可配合氧疗，充氧自血回输法等。 更多信息请访问：百考试题医师网校 医师论坛 医师在线题库 百考试题执业医师加入收藏 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。 详细请访问

www.100test.com