

2010年内科护理：局限性脑梗死的实验室和其他检查护士资格考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/0/2021\\_2022\\_2010\\_E5\\_B9\\_B4\\_E5\\_86\\_85\\_c21\\_36.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/0/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E5_86_85_c21_36.htm)

1.头颅CT 急性脑梗塞多于起病24~48小时后于CT中见到低密度病灶。而直径在5mm以内或脑干部病灶往往不能显示。 2.核磁共振（MRI）来源

：[www.examda.com](http://www.examda.com) 可发现脑梗塞，特别是脑干、小脑及腔隙梗塞。也可鉴别出血梗塞和缺血梗塞。 3.脑脊液 不做常规检查。非出血性梗塞脑脊液检查正常。 更多信息请访问：百考试题医师网校 医师论坛 医师在线题库 百考试题执业医师加入收藏相关推荐：2010年内科护理：局限性脑梗死的诊断和鉴别诊断 2010年内科护理：局限性脑梗死的治疗 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

[www.100test.com](http://www.100test.com)