

2010年儿科护理：新生儿硬肿症的临床表现护士资格考试

PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/0/2021\\_2022\\_2010\\_E5\\_B9\\_B4](https://www.100test.com/kao_ti2020/0/2021_2022_2010_E5_B9_B4)

[\\_E5\\_84\\_BF\\_c21\\_383.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/0/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E5_84_BF_c21_383.htm) 新生儿硬肿症是指由多种原因引起的皮肤和皮下脂肪变硬与水肿。早产儿发病率高。来源：考试大一般以生后1周内发生，寒冷季节多见。夏季发病者，多是严重感染、重度窒息引起。表现为纳差或拒乳，反应差，哭声低，心音低钝，心率减慢，尿少，体温常低于35℃，重者患儿可低于30℃。皮肤发凉、硬肿，颜色暗红，不易捏起，按之如硬橡皮。硬肿发生顺序为：小腿 大腿外侧 下肢 臀部 面颊 上肢 全身，严重者可导致肺出血、循环和呼吸衰竭及肾脏等多脏器损害，甚至发生DIC.硬肿可分轻、中、重三度。轻度硬肿面积>50%。更多信息请访问：百考试题护士网校 护士论坛 护士在线题库 百考试题执业护士加入收藏相关推荐：2010年儿科护理：新生儿硬肿症的病因及发病机制 2010年儿科护理：新生儿硬肿症的临床表现 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

[www.100test.com](http://www.100test.com)