

2010年内科护理：肝硬化贫血的原因护士资格考试 PDF转换
可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/0/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E5_86_85_c21_428.htm

肝硬化时，常有不同程度的贫血，其中2 / 3的为轻至中度，主要为正常细胞性或小红细胞性贫血，偶见巨细胞性贫血。引起贫血的原因是：脾阻性充血，使大量红细胞长期淤滞在脾窦而发生溶血。脾功能亢进。

来源：www.examda.com 由于脂肪代谢紊乱，血浆中有某种异常类脂质可引起溶血。维生素B12、叶酸等营养物质的摄入不足、吸收不良和利用障碍。营养性巨红细胞性贫血在酒精性肝硬化中较常见。在非酒精性肝硬化中、失血和缺铁可能是贫血的重要原因。晚期病例常有红细胞生成抑制和铁の利用障碍。更多信息请访问：百考试题护士网校 护士论坛 护士在线题库 百考试题执业护士加入收藏相关推荐：2010年内科护理：肝硬化患者为什么会吐血 2010年内科护理：肝硬化患者发生脾功能亢进的治疗 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com