

2010年儿科护理：儿童孤独症的诊断标准护士资格考试 PDF
转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/0/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E5_84_BF_c21_464.htm 儿童孤独症的诊断标准，须符合下列5条：

1、通常起病于3岁以内。 2、接触交往障碍需具有下列中两项症状： 不能用注视、表情、姿势或手势进行交往； 不能与其他孩子建立伙伴关系； 遇到挫折时，不会寻求支持或安慰。当别人遇到挫折时，也不会主动给予别人支持和安慰； 不能对集体的欢乐产生共鸣。 3、言语交往障碍需具备下列中两项症状：
www. Examda.CoM考试就到百考试题 言语发育延迟或不发育，例如不会呀呀学语，可有以手势或其他形式代替言语交流的倾向； 如有某种程度的言语功能，也缺乏主动的或持续的言语交流； 刻板重复地使用某些语词，或别出心裁地使用某些语词； 言语的声调、速度、节律、重音等方面的异常。 4、兴趣和活动异常需具备下列症状之一： 兴趣刻板、狭窄； 对某种东西特别依恋； 强迫性地进行某种特殊的仪式性行为。 www.

Examda.CoM考试就到百考试题 刻板重复的动作和姿势； 对某些东西（例如玩具）的非主要特性特别感兴趣； 对个人生活环境不愿或拒绝作任何的变动。 5、排除儿童精神分裂症及婴儿痴呆。 更多信息请访问：百考试题护士网校 护士论坛 护士在线题库 百考试题执业护士加入收藏 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com