

2010年儿科护理：儿童遗尿症的间接原因护士资格考试 PDF
转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/0/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E5_84_BF_c21_498.htm

(1) 发育迟缓：神经中枢发育迟缓造成神经中枢对尿感信息敏感度低，排尿时不能自醒；膀胱括约肌发育迟缓导致收缩力弱，使膀胱容量减少并且憋不住尿。(2) 遗传因素：据一组1815名儿童及其家庭成员的调查，患有遗尿症的近亲（主要指父母）数目越多，其子女发生遗尿症的概率也越大。父母均有遗尿症病史时，子女的发病概率为77%。父母一方有遗尿症病史时，子女的发病概率为43%。父母均无遗尿症病史时，子女发病概率仅为15%。来源：

www.100test.com (3) 精神心理因素：诸如突然受凉，白日玩耍过度，心情焦虑，情绪紧张，行为失常，夜间恐惧，与父母关系不融洽及不适应新的环境。来源：考试大的美女编辑们 (4) 隐性脊柱裂：尿床儿童约占半数以上同时伴有隐性脊柱裂。隐性脊柱裂主要发生在腰骶部，骨头裂开处与神经根粘连，使神经根受到损害，不能正常控制排尿而出现遗尿。间接原因只能间接导致或加重遗尿，最终导致遗尿的直接原因（根本原因）还是膀胱括约肌收缩力弱，神经中枢对尿感信息敏感度低。隐性脊柱裂只能加重尿床病症状，尿床病治愈后隐性脊柱裂也不可能痊愈。有隐性脊柱裂的儿童不一定遗尿，有隐性脊柱裂的儿童遗尿也并不是完全由隐性脊柱裂引起的。更多信息请访问：百考试题护士网校 护士论坛 护士在线题库 百考试题执业护士加入收藏相关推荐：2010年儿科护理：儿童遗尿症的遗尿危害 2010年儿科护理：儿童遗尿症概念及分类 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接

下载。详细请访问 www.100test.com