

2010年内科护理：肾病综合征的病因和发病机制护士资格考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/0/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E5_86_85_c21_49.htm 1.病因 多种肾小球疾病可引肾病综合征

，可分为原发性肾小球疾病和继发性肾小球疾病。 2.发病机制 各种原因引起肾小球滤过膜通透性增高引起。来源：考试大 大量蛋白尿 肾小球滤过膜通透性增高引起大量蛋白质渗出，超过肾小管重吸收量，形成大量蛋白尿。

低蛋白血症 大量白蛋白从尿中丢失，刺激肝脏合成蛋白质增加，但蛋白质丢失超过肝脏的代偿能力，出现低蛋白血症。来源：考试大

水肿 由于低蛋白血症造成血浆胶体渗透压下降，使水分从血管漏出，引起水肿。此外，肾小管对钠、水重吸收增加也可引起水肿。 高脂血症 由于低蛋白血症使肝脏合成脂蛋白增加，脂蛋白分解减少，使血脂增高。

相关推荐：2010年内科护理：肾病综合征的临床表现 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com