

2010年儿科护理：新生儿黄疸延迟消退常见原因和处理护士
资格考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/0/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E5_84_BF_c21_554.htm 新生儿黄疸延迟消退常见原因和处理

：1.母亲产前用药：如给母亲产前应用了大量催产素或维生素K等。来源：考试大 2.产程中有窒息、缺氧：由于呼吸困难、缺氧，一方面加重了酸中毒，另一方面抑制了葡萄糖醛酸转移酶的活力，影响了胆红素的代谢进程；3.分娩时损伤出血，使胆红素产生增加；来源：www.100test.com 4.产后受冻、饥饿：此时体内游离脂肪酸等有机阴离子增多，与胆红素竞争与白蛋白结合，而使胆红素游离血中，延迟喂养，胎粪排出延迟，可增加肠-肝循环，使血中非结合胆红素增加。为了预防新生儿发生高胆红素血症，孕母产前用药要慎重，能不用的药物尽量不用；分娩过程中严密监护，以免胎儿发生窒息和产伤；生后注意保持新生儿体温，适当提早喂养。若已发生新生儿高胆红素血症，除病因治疗外，可应用光疗、血浆或白蛋白等治疗。更多信息请访问：百考试题护士网校 护士论坛 护士在线题库 百考试题执业护士加入收藏相关推荐：2010年儿科护理：病理性黄疸的主要原因 2010年儿科护理：生理性黄疸与病理性黄疸区别 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com