

2010年五官科护理：鼻中隔偏曲的预防护理护士资格考试

PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/0/2021\\_2022\\_2010\\_E5\\_B9\\_B4\\_E4\\_BA\\_94\\_c21\\_69.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/0/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E4_BA_94_c21_69.htm)

一、鼻中隔偏曲与矩状突 1、预防重点主要是防止鼻部外来损伤。 2、矫形手术后鼻腔粘塞物可于术后24-48小时内抽除。可先抽右侧，翌日再抽另一侧。 3

、由于鼻内手术后粘膜反应较明显，抽去纱条后，鼻内可薄薄地涂擦黄连膏。 4、若切口愈合良好，术后5天可除尽填塞物。采集者退散 二、鼻中隔血肿 1、无特殊预防方法，唯注意外伤。 2、手术后24-48小时，取出填塞物。 3、禁止喷嚏，无法控制时，轻轻把鼻子捏紧，再开口打喷嚏。 三、鼻中隔脓肿 1、未化脓之前，认真敷药。来源：考试大的美女编辑们 2、切开或自溃后，注意引流通畅。 3、换药清洁创口时注意不要损伤对侧鼻腔的粘膜。否则，粘膜因损伤而形成溃疡，则势必导致鼻中隔穿孔，为今后矫形增加麻烦。 四、鼻中隔溃疡 参阅上文“鼻中隔脓肿”的有关内容。本文来源：百考试题网 五、鼻中隔穿孔 1、改掉随便挖鼻的习惯。 2、对鼻中隔血肿、鼻中隔脓肿、鼻中隔溃疡等病，需精心治疗，不能延误拖延。 3、手术后护理 更多信息请访问：百考试题护士网 校护士论坛 护士在线题库 百考试题执业护士加入收藏相关推荐：2010年五官科护理：鼻中隔偏曲的非手术治疗 2010年五官科护理：鼻中隔偏曲的手术注意事项 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。 详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)