

2010年外科护理：急性胰腺炎检查护士资格考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/0/2021\\_2022\\_2010\\_E5\\_B9\\_B4\\_E5\\_A4\\_96\\_c21\\_711.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/0/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E5_A4_96_c21_711.htm)

急性胰腺炎检查：一、血常规多有白细胞增多，重症患者因血液浓缩红细胞压积可达50%以上。来源：考试大的美女编辑们二、淀粉酶测定 血淀粉酶一般在发病后八小时开始升高，48 - 72小时后下降，3 - 5天内恢复正常。血清淀粉酶超过500苏氏单位有重要诊断价值。尿淀粉酶在发病后8 - 12小时开始升高，维持时间较长，连续增高时间可达1 - 2周，因此适用于就诊较晚的病例。超过300单位 / 小时有诊断价值。 [www.Examda.CoM](http://www.Examda.CoM)考试就到百考试题 三、淀粉酶肌酐清除率比值 肌酐清除率正常值不超过5%，急性胰腺炎可增高达3倍，四、血清脂肪酶测定 正常值为0.20.7 单位%，急性胰腺炎时常超过1.5单位%。五、血清正铁血白蛋白。六、生化检查 血糖升高，血钙降低，甘油三酯增高。来源：考试大 七、X线腹部平片 B超与CT扫描、X线平片检查可观察有无肠麻痹，并有助于排除其他急腹症。B超检查及CT扫描观察胰腺的大小和形态，并对发现假性囊肿颇有帮助。更多信息请访问：百考试题护士网校 护士论坛 护士在线题库 百考试题执业护士加入收藏相关推荐：2010年外科护理：急性胰腺炎治疗原则 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)