

2010年外科护理：肠扭转的病因护士资格考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/0/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E5_A4_96_c21_718.htm 肠扭转的发生见于多种原因造成。解剖方面的因素是引起扭转的先决条件，而生理或病理方面的因素是其诱发因素。肠袢发生扭转的原因有三个重要的因素：

：（一）肠袢和其系膜的长度比肠袢两端根部间的距离相对地过长，即轻易发生扭转。来源：www.examda.com（二）在上述解剖因素的基础上，如肠袢本身的重量增加，由于重力的关系轻易促使扭转发生，扭转后也不易自行复位。所以在临床肠扭转常见于饱餐、食物内纤维残渣多、大便秘结，肠腔内有蛔虫团、肠壁上有较大肿瘤、先天性巨结肠等情况下。来源：www.examda.com（三）外力推动，强烈的肠蠕动和体位的忽然改变，如身体忽然旋转用力弯腰，也能促使肠扭转的发生，因些，避免在饱餐后立即进行重体力劳动，尤其是需要身体前俯和旋转的劳动，对预防肠扭转有一定意义。

更多信息请访问：百考试题护士网校 护士论坛 护士在线题库 百考试题执业护士加入收藏相关推荐：2010年外科护理：肠扭转的检查 2010年外科护理：肠扭转的治疗原则 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com