

2010年肿瘤护理：壶腹周围癌治疗护士资格考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/0/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E8_82_BF_c21_785.htm 本病一旦确诊，应行胰十二指肠切除术，尔后进行各种方式的消化道重建，这是目前最有效的治疗。如癌肿侵及门静脉，广泛腹膜后转移，肝转移等不能切除，则应行内引流术以减轻黄疸。若发生十二指肠狭窄应行胃空肠吻合以解除十二指肠梗阻。 <http://ks.100test.com> 化学疗法一般不敏感，术后可用1~2个疗程，此外还可用有关中药等治疗。 <http://ks.100test.com> 胰头癌为胰腺癌中常见者，约占70%，以导管细胞癌多见，腺泡细胞癌较少见，此外尚有多形性腺癌、粘液癌、纤维细胞癌。其临床表现酷似壶腹癌，此时表示癌肿已发展到相当程度，往往有邻近组织器官的浸润，转移，故此切除率低。本病的诊断与治疗与壶腹癌相似。但切除率及五年治愈率低。更多信息请访问：百考试题护士网校 护士论坛 护士在线题库 百考试题执业护士加入收藏相关推荐：2010年肿瘤护理：壶腹周围癌症状 2010年肿瘤护理：壶腹周围癌的检查 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com