

2010年肿瘤护理：甲状腺癌发病机率护士资格考试 PDF转换
可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/0/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E8_82_BF_c21_788.htm 甲状腺结节女：男约为4：1.结节发生率随着年龄的增加，>50岁在美国发生达5%.行尸检，手术或B超，结节发生率更高。50%的结节是良性。每年新的结节发生率0.1%，开始于生活早期。有头颈部放射史发生率较高达2%.相比之下，甲状腺癌是不常见的。在美国，一生中被诊断为甲状腺癌的风险为1%（男性0.845，女性0.305）

。2003年在美国有22,000新诊甲状腺癌病例，最新的流行病学估计患病数为293000.如同甲状腺结节，甲状腺癌的发生率女性是男性的3倍。甲状腺癌每年发生率已增至4%，在女性居所有恶性肿瘤的第8位。年龄在15-24岁人群当中，甲状腺癌占有所有诊断的恶性肿瘤的7.5%-10%.甲状腺癌在白人中发生率高于黑人。据1996-2000年期间数据统计，虽然各个年龄段都可发生甲状腺癌，但高发年龄在女性为50-54岁，在男性为65-69岁。来源：考试大 据NCDB（国家癌症数据库）统计在1985年1995年10期间53,856名甲状腺癌病人接受治疗，80%为乳头癌，11%为滤泡癌，3%为霍斯勒氏细胞癌，4%为髓样癌，2%为未分化癌。在2003年，在美国近1400名患者死于甲状腺癌。有趣的是，虽然甲状腺癌多见于女性，死亡率男性高于女性，因为男性患者被诊断时的年龄较大。来源：考试大 发生率从1950至2000增加240%，但死亡率减少44%.虽然这些统计数据有许多不定因素发生变化，但是发生率增高可能跟放射接触增加相关。相反的，死亡率的降低可能是更多的治疗方式的使用，但这个结论可能存在时间领先偏倚

。更多信息请访问：百考试题护士网校 护士论坛 护士在线题库 百考试题执业护士加入收藏 相关推荐：2010年肿瘤护理：甲状腺癌的常见病因 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com