

2010年内科护理：老年糖尿病并发脑梗塞预防低血糖反应的
护理护士资格考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读
原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/0/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E5_86_85_c21_808.htm 糖尿病合并脑梗塞病人，消化功能减退，纳食少。注射胰岛素后，对病人的饮食情况不过问而引起低血糖又未及时发现，将造成严重后果。低血糖可刺激交感神经使之兴奋，促进肾上腺分泌增加，引起心血管功能紊乱，严重者抢救无效而死亡。如病人出现面色苍白、乏力、出冷汗，心悸、饥饿、精神不集中、反应迟钝、头晕、恶心、烦躁、嗜睡甚至昏迷，则应考虑有无低血糖反应发生。一旦发生则应立即停用降糖药，轻者口服糖水、糖果或含糖多的食物，重者应静脉注射葡萄糖。www.Examda.CoM 更多信息请访问：百考试题护士网校 护士论坛 护士在线题库 百考试题执业护士加入收藏相关推荐：2010年内科护理：老年糖尿病并发脑梗塞应用胰岛素的护理 2010年内科护理：老年糖尿病并发脑梗塞的饮食护理 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com