

2010年儿科护理：小儿充血性心力衰竭容易与哪些疾病混淆
护士资格考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文
https://www.100test.com/kao_ti2020/0/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E5_84_BF_c21_82.htm

1、婴幼儿心力衰竭应与以下情况区别

：（1）重症支气和肺炎及毛细支气管炎：患儿有呼吸困难、呼吸及脉搏增快等体征。由于肺气肿而膈肌下降，可使肝脏在肋下2~3cm处触及。以上体征与心力衰竭相似，但其心脏不扩大，肝脏边缘并不圆钝。（2）于紫型先天性心脏病

：因患儿缺氧，常出现呼吸增快、烦躁、青紫加重及心率加快，但并无心力衰竭的其它表现如肝脏肿大等。来源：考试大

2、年长儿心力衰竭应与下疾病鉴别：来源：考试大（1）

急性心包炎、心包积液及慢性缩窄性心包炎：这些疾病发生心包堵塞及静脉淤血时，其症状与心力衰竭类似，但心包疾病有以下特点可资鉴别：奇脉明显。腹不较突出，与其它部位水肿不成比例。肺充血多不明显，故患儿虽有颈静脉怒张、腹水及肝脏明显增大等体征，但呼吸困难不显著，多能平卧。X线检查、超声心动图检查及同位素心脏血池扫描也可协助诊断。

（2）肝、肾疾病引起明显腹水者：应与右心衰竭鉴别。更多信息请访问：百考试题护士网校 护士论坛 护士在线题库 百考试题执业护士加入收藏相关推荐：

2010年儿科护理：小儿充血性心力衰竭的检查 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com