

2010年内科护理：红斑狼疮的皮肤病变护士资格考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/0/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E5_86_85_c21_86.htm

在红斑狼疮患者中80%有皮肤损害，常在皮肤暴露部位，出现对称性皮疹，典型者在双面颊和鼻梁部呈蝶形红斑。这种皮损为不规则水肿性红斑，鲜红或紫红色，边缘有的清楚，有的模糊，表面光滑，有时红斑上可有鳞屑。在病情缓解时，红斑可消退，留下棕黑色的色素沉着，较少出现萎缩现象，在系统性红斑狼疮患者中也可见到盘状红斑样皮肤损害，这种红斑与蝶形红斑略有不同，常呈不规则圆型，边缘略微突出，毛细血管明显扩张，红斑上粘有鳞屑，毛囊扩大。在晚期红斑处可出现皮肤萎缩，有的还能瘢痕化或出现色素消失现象。盘状红斑，在面，颌，臂部较多见。除此之外，在手掌的大、小鱼际，指端及甲周也可出现红斑，有的患者还在下肢出现网状青斑，患者若发现自己出现上述红斑时，一定要到医院找有经验的医生诊治，以迅速确定诊断，积极治疗，稳定病情，在没看弄清之前，千万不能胡乱用药，女同志在面部出现红斑时，更不能随使用化妆品，以免加重病情。更多信息请访问：百考试题护士网校 护士论坛 护士在线题库 百考试题执业护士加入收藏相关推荐：2010年内科护理：狼疮性肺炎护理要点 2010年内科护理：狼疮性心脏损害护理要点 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com