

2010年护士妇产科护理：子宫肌瘤的类型与症状护士资格考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/0/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E6_8A_A4_c21_875.htm 子宫肌瘤是女性生殖器中最常见的良性肿瘤，也是人体中最常见的肿瘤之一。子宫肌瘤主要由构成子宫肌壁的平滑肌细胞增生形成故其确切的名称应为“子宫平滑肌瘤”，通称子宫肌瘤。据大量尸体解剖材料发现，子宫肌瘤的发生率，在30岁以上的妇女为20%，而以40-50岁女性发病率最高，可高达5077%之多。www.Examda.CoM

子宫肌瘤好发于30-50岁的女性，且在绝经期后有缩小的可能，证明：于子宫肌瘤的生长与体内过多的雌激素刺激有关。子宫肌瘤的大小差异甚大，小的直径可在1厘米以下，如同黄豆大小；大者可达数十千克，远远超过了足月妊娠腹的大小肌瘤的数目也不一定，少者可仅为一个单发，多者可达数百个。子宫肌瘤按其生长位置与子宫壁各层的关系可分为“壁间肌瘤”、“粘膜下肌瘤”、“浆膜下肌瘤”三种类型、子宫肌瘤开始均从肌层发生，若肌瘤始终位于肌层中，则称为“壁间肌瘤”；壁间肌瘤常使子宫增大，宫腔弯曲变形，子宫内膜面积增加，又由于壁间肌瘤的存在影响子宫收缩。故常引起经血量过多。经持续时间延长。月经来潮过频以及不孕等症。来源：www.examda.com 肌瘤在生长过程中，往往易向阻力较小的方向发展当其突向子宫腔后、其表面仅覆盖一层子宫内膜，称为“粘膜下肌瘤”其至仅以一蒂与子宫相连；粘膜下肌瘤犹如宫腔内异物刺激子宫，促其发生痉挛性收缩，此时引起的小腹疼痛，酷似流产一般：当粘膜下肌瘤被排挤下降时，瘤蒂也逐渐被拉长，更有甚者，粘膜下肌瘤竟通

过宫颈管，垂脱于阴道中。甚或突露于阴道口、由于粘膜下肌瘤常伸入阴道内，且其蒂部血运较差。故易感染、坏死。除月经改变外，比壁间肌瘤严重外，还可出现不规则阴道流血，脓血白带。有臭味因此，粘膜下肌瘤是症状最严重的一种肌瘤。或肌瘤向子宫体表面突出。其上由一层腹膜复盖，称为“浆膜下子宫肌瘤”。肌瘤继续向腹腔生长时，最后可形成仅有一蒂与子宫相连的带蒂浆下子宫肌瘤。瘤蒂含有的血管是肌瘤唯的血源。如发生瘤蒂扭转，则瘤蒂可坏死断离，肌瘤脱落于腹腔，贴靠邻近的组织器管如大网膜、肠系膜等。可两次获得血液供应，而成为“寄生肌瘤”或“游离肌瘤”，有时，可使在大网膜随行部分扭转或阻塞而发生漏出作用，形成腹水，子宫肌瘤的症状决定肌瘤生长的部位。大小、生长速度、有无继发变性及合并症等而异，浆膜下子宫肌瘤多以腹部包块为主要症状，极少出现子宫出血、不孕症等。当肌瘤发展增大到一定程度时，可产生临近脏器压迫症状。压迫膀胱时。可出现尿频、尿难：压迫直肠时，则有直肠憋坠、排便困难、便条变细等症状出现。更多信息请访问：[百考试题护士网校](#) [护士论坛](#) [护士在线题库](#) [百考试题执业护士加入收藏](#) [相关推荐：2010年护士妇产科护理：子宫肌瘤的症状与防治](#) [2010年护士妇产科护理：子宫颈外翻临床表现](#) [100Test 下载频道](#) 开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com