

2010年手术室护理：皮肤软组织扩张术后并发症的防治与护理
护士资格考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/0/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E6_89_8B_c21_906.htm (1) 血肿是术后较常见的并发症，主要与术中止血不彻底和术后引流不畅有关，因此手术应避开月经期，术前停用营养保健品15天以上，术后主要观察皮肤色泽，术区肿胀、疼痛程度，保持负压引流管的通畅。术区应当加压包扎。来源：考试大 (2) 扩张器外露是最严重的并发症，当发生扩张器外露时应保护创面以免继发感染，在可能的情况下继续注水扩张，尽快行二期手术。在扩张过程中应注意囊内压和表面组织的血液供应情况，并保护扩张部位。(3) 疼痛常发生在头部皮肤扩张，一般在扩张6~12h内恢复，不需服用止痛药物，如果疼痛剧烈则可回抽生理盐水减压，以缓解疼痛。感染一般很少发生，做好充分的术前准备。术中严格无菌操作，术后常规使用抗生素是防止感染的有效方法。更多信息请访问：百考试题护士网校 护士论坛 护士在线题库 百考试题执业护士加入收藏 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com