

2010年手术室护理：皮肤软组织扩张术扩张囊内注水的护理
护士资格考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文
https://www.100test.com/kao_ti2020/0/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E6_89_8B_c21_907.htm 手术后7~10天，伤口愈合拆线后可开始注水，一般间隔3~7天，注水一次，首次剂量为扩张器容量的10%~15%。以后每次酌加，推注时应注意阻力大小及局部皮肤血运和患者的疼痛情况。放置2个以上扩张器的注水时应注意血压、呼吸及压迫症状，每次注水不宜过多或交替注水，有压迫症状者可抽出一部分液体减压，并观察30min。注水后按压注射点1min，以防止液体外渗，注水完成后应根据所需皮瓣大小，扩张4~10周，扩张期间应嘱患者做好自我防护，勿穿着紧身衣裤，避免挤压水囊，防止皮肤擦伤或破裂，同时注意个人卫生，防止感染，定期随诊。来源

：www.examda.com 更多信息请访问：百考试题护士网校 护士论坛 护士在线题库 百考试题执业护士加入收藏相关推荐：
2010年手术室护理：皮肤软组织扩张术后并发症的防治与护理 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com