

2010年初级护师辅导：化疗药物顺铂观察及护理要点护士资格考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/0/2021\\_2022\\_2010\\_E5\\_B9\\_B4\\_E5\\_88\\_9D\\_c21\\_959.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/0/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E5_88_9D_c21_959.htm)

1、恶心、呕吐的副作用很强烈，恩丹西酮等的使用可以改善症状。 2、为了减轻肾脏损害可在用药前后大量补液（必须在给药前2~16小时和给药后6小时内）。来源：[www.100test.com](http://www.100test.com) 3、注意观察出入量的平衡，并保证患者排尿的方便和安全，禁止使用呋塞米以增加尿量，可以加用甘露醇以加速肾脏的排泄。慢性肾脏病史禁用，用药中避免使用肾毒性药物。注意询问患者有无耳鸣，及时发现，停药观察。 4、因为末梢神经的损害，指尖和足底麻痹，可使手的精细动作和脚的行走困难。个体差异很大，要注意患者生活质量的援助，危险因素的预防。本药可能影响注意力集中，驾驶和机械操作时应谨慎。 5、患者在治疗期间需避孕。来源：考试大 6、使用剂量过大时，可在给药后3小时内采集透析，以清除本药。 7、本药不能接触含铝器具。

（因铝与顺铂会发生反应，产生黑色沉淀及气体）更多信息请访问：百考试题护士网校 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)