

2010年初级护师辅导：化疗药物紫杉醇观察及护理要点护士
资格考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/1/2021_2022_2010_E5_B9_B4

[_E5_88_9D_c21_1017.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/1/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E5_88_9D_c21_1017.htm) 1、不良反应有过敏反应。用药数分钟后出现荨麻疹、呼吸窘迫、支气管痉挛、低血压。几乎所有的反应发生在用药后最初的10分钟。给药期间尤其输液开始的15分钟内应密切观察有无过敏反应。治疗前按常规应用地塞米松、苯海拉明和H₂受体拮抗剂进行预处理。来源:百考试题网 2、药物外渗的血管炎症改善后，不要再在相同的血管使用相同的药物。 3、使用顺铂后给予本药，本药清除率大约降低30%，产生严重的骨髓抑制。 4、肌肉痛、关节痛的情况下，使用镇痛药。 5、注意骨髓抑制观察和处理。百考试题(100test.com) 6、滴注本药时应采用非聚氯乙烯材料的输液用具，并使用孔径小于0.22um的微孔膜过滤器。更多信息请访问：百考试题护士网校 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com