

2010年初级护师辅导：化疗药物表柔比星观察及护理要点护士资格考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文  
[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/1/2021\\_2022\\_2010\\_E5\\_B9\\_B4\\_E5\\_88\\_9D\\_c21\\_1019.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/1/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E5_88_9D_c21_1019.htm)

- 1、密切观察心脏毒性的发生，仔细询问病人，定期监测心功能、心电图。
- 2、局部刺激性较大，注射时要避免漏出血管外。来源：考试大
- 3、用药后1~2日可出现红色尿，嘱病人多饮水。
- 4、在进行纵隔和胸腔放疗期间不宜用本品或减量。
- 5、加强骨髓抑制的观察及处理。来源：www.100test.com
- 6、与肝素、头孢菌素等有配伍禁忌。辅酶Q10、维生素C、维生素E可降低心脏毒性。
- 7、配制好的液体在室温下保持稳定48小时，建议24小时内使用。
- 8、使用时避光。来源：www.100test.com
- 9、不宜与碱性药物、地塞米松、琥珀酸氢化可的松同时滴注。与氨茶碱接触可使溶液变成紫蓝色。

更多信息请访问：百考试题护士网校 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问  
[www.100test.com](http://www.100test.com)