

2010年五官科护理：散光的护理评估护士资格考试 PDF转换
可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/1/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E4_BA_94_c21_1115.htm 散光的护理评估：（一）健康史询问病人有无视疲劳、视物模糊、重影，是否配戴眼镜、矫正视力及舒适度。（二）临床表现 1.症状、体征（1）视力减退 散光性质、屈光度高低及轴的方向等因素对视力有不同程度的影响。低度数散光对视力影响不大；高度数散光，视近视远均模糊不清，似有重影，常眯眼视物，以达到针孔或裂隙的作用来减少散光。（2）视疲劳 高度散光病人无此症状或症状较轻，轻度散光病人症状较明显。（三）辅助检查 1.验光 经客观验光法和主观验光法检查，可以确定散光轴向和度数。 2.角膜曲率计 通过测定角膜中央两条主要子午线上的屈光力来确定角膜散光的轴位和度数。 3.角膜地形图 较角膜曲率计更能全面反映角膜前表面屈光状态，尤其对圆锥角膜等不规则散光可精确测定。 更多信息请访问：百考试题护士网校 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com