

2010年基础护理：精神分裂症患者的饮食护理护士资格考试  
PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/1/2021\\_2022\\_2010\\_E5\\_B9\\_B4\\_E5\\_9F\\_BA\\_c21\\_1121.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/1/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E5_9F_BA_c21_1121.htm) 不同类型的精神分裂症患者由于受病症影响，在饮食方面可能会出现一些问题，如被害妄想患者因害怕食物中毒而不敢进食，又如木僵患者则因动作呆滞无法进食等。因此对于不同的精神分裂症患者在饮食方面要采取不同的护理方法。有被害妄想的病人，可采用集体就餐或让病人参加开饭工作，必要时亲自尝一口，以消除病人的顾虑；对自罪妄想的病人，可以将饭菜搅拌在一起，其误认为是剩饭剩菜，以达到进食的目的；如对有暴饮暴食行为的患者，饭菜温度要适宜，食鱼时剔去骨刺并且适当限制病人进食量；来源：www.100test.com 木僵病人有的在夜深人静悄悄起床自动进食，所以应将饭菜放置在病人床旁，方便病人自动进食，护理人员应避免病人视线；老年病人、消化功能差的病人应给予易消化的食物；来源：考试大 对药物反应严重、吞咽困难者可给予流质或半流质饮食，进食要缓慢，要催促，以防噎食；对因宗教信仰以及有饮食嗜好者应设法满足其需要，对过分挑剔者可不作迁就；对坚持不进食以及进食障碍者应保证其足够的营养及水分的摄入，并设法了解病人饮食障碍的原因，进行说服劝解，并协助进食。无效时给予鼻饲，鼻饲液可制成富含多种营养成分的混合液。如牛奶加肉汤、菜汁、果汁等。必要时遵医嘱给予补液。更多信息请访问：百考试题护士网校 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)