

2010年心理护理：遇毒蛇咬伤如何急救护士资格考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/1/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E5_BF_83_c21_1198.htm 现场判断<http://ks.100test.com> 毒蛇与

无毒蛇，以及其他不同种类毒蛇咬伤人体后，表现各不相同。毒蛇与无毒蛇咬伤判断：毒蛇咬伤后，牙痕呈针尖状，或伴有两排锯齿状的浅小牙痕。局部伤口可出现水肿、渗血、坏死，全身症状明显。凡是出现咬伤局部麻木、肌肉抽搐、恶心、呕吐，甚至呼吸困难等表现时，均提示毒性作用强，伤员预后不良。无毒蛇咬伤后，牙痕呈锯齿状，细而成排（2排或4排），局部症状不明显，几乎没有全身症状。救治机理 百考试题(100test.com) 被蛇咬伤后，不经抗蛇毒血清治疗很难痊愈，但正确的现场救治可不同程度地减少或阻断蛇毒进入血液循环，使其毒性作用减弱，为后续治疗争取时间。急救步骤 被蛇咬伤后，如不能确切排除是被毒蛇咬伤者，都应按毒蛇咬伤进行观察和处理。呼叫120：拨打120急救电话。将伤者移离现场，为防被激怒的毒蛇可能反复咬人。若有机会可将蛇杀死，但不要损害蛇的头部。如有条件，应将蛇与伤员一起入院。限制活动：保持冷静，限制被咬伤肢体的活动。让受伤部位保持在低于心脏的水平，可延缓蛇毒被吸收。立即结扎：用指宽的绷带或布条紧扎在伤口上方的近心端上，绷带与皮肤间以能够放置一个手指为宜（以免组织缺血坏死）。清创排毒：用冷却的沸水或肥皂水清洁伤口，有条件者可用1：5000高锰酸钾溶液清洗，如有毒牙残留应尽快去除。用吸奶器、火罐或塑料瓶在伤口处持续吸引。如有条件，也可内服或外敷蛇药。平稳送院：在伤员中毒症状

明显时，应在上述措施进行的同时，立即用车或担架将伤员平稳地送入医院（以蛇毒防治所或大型综合医院为佳）。救治的有效指标 局部疼痛、出血等症状没有加重。 伤员没有出现全身症状或症状减轻。 特别注意 来源：考试大 被蛇咬伤者必须冷静，禁止活动或惊慌奔跑，以免血液循环加速，使蛇毒迅速扩散。 禁食禁饮，尤其禁饮酒、浓茶、咖啡等兴奋性饮料。 来源：www.100test.com 目前有人建议在结扎时每隔一定时间放松绷带，以防止组织坏死。但本书建议在结扎时注意力度，以恰好只能放一指为佳，在入院处理前不宜放松绷带，以免毒液进入血液循环而迅速扩散。 不主张使用局部冰敷，因其不能延缓蛇毒扩散，且可能加重组织损伤或坏死。 尽量避免用口帮助伤员吸出毒液。在不明毒蛇种类时，不宜切开伤口吸毒。 急救口诀 毒蛇咬伤，速离现场。 http://ks.100test.com 放低伤肢，冷静半躺。立即结扎，一指为佳。清创排毒，入院妥当。 更多信息请访问：百考试题护士网校 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。 详细请访问 www.100test.com