

2010年心理护理：气管异物怎样抢救护士资格考试 PDF转换
可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/1/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E5_BF_83_c21_1200.htm

气管异物是导致小孩意外死亡的常见原因，多发生在1—5岁的儿童，由于其发病骤然，病变迅速，危险性大，家长了解这些知识很有必要。常见的气管异物有西瓜子、花生米、糖块、硬币、黄豆以及一些光滑的小玩具等。由于异物完全堵塞气管后可引起窒息，超过四分钟便会危及生命，即使抢救成功，也常会留下严重的后遗症。

所以现场急救非常重要。下面介绍几种易于掌握的救治方法：

： www.Examda.CoM 1.立即塞一个牙垫或类似牙垫的代用品，把口张开，以便从口腔中排出异物。 2.向病者口腔内伸进食指或一个大棉扦，或牙刷柄，直达咽部，刺激其作防御性深呼吸。 3.设法使病者增加上腹部的腹压以排除气管异物。

（1）抢救者站在病人背后，搂住病人腰部，用右手拇指的根背部顶在病人上腹部，左手叠于右手之上，间断向被救人的胸腹部上、后方用力挤压，借助膈肌压缩肺脏，产生气冲将气管内异物排出。（2）当病人昏倒时，可将其仰卧，抢救者可双膝跪于地，面对病人，张开双腿于其两侧，上身前倾，握紧右拳，置右拳于剑突直下方，左掌紧压右拳，突然迅速地向下朝前内方向垂按其中上腹。此时患者可能于受重压之后呕出胃内容物，同时，也可见喷咳出梗于气管的异物。

为了避免再度吸入胃内容物，当咳出异物时应令其侧卧。 4.如果病人为小儿时，还可施行下列三种现场急救法：来源

： www.100test.com （1）急救时救护者：取坐位，让小儿面向前坐于救护者的腿上，然后救护者用两手的中指和食指，用

力向后上方挤压小儿的上腹部，压后随即放松，重复进行。

(2) 对年龄稍大一点的小儿，可让其趴在救护者的膝盖上，头朝下，捶其背部。(3) 两名救者时，可1人将小儿倒提离地，1人用手拍背，掏咽部，可使异物迅速排出。 www.

Examda.CoM 以上诸法，都是现场急救中行之有效的，只要掌握要领，不需特别训练，大都可以获得成功。当然，如不成功应速送医院抢救。此外，如果到医院非常方便，一旦怀疑气管异物时可立即送医院救护。如为少年儿童时，可马上将病人面向抱他的人侧身抱起，使头部枕在抱他的人的左臂上。这样抱时可以让异物较为顺利地进入较为粗短的右侧支气管内，避免异物在气管内上下或长住，而让右侧支气管堵塞，使左侧可移动而进行呼吸，为去医院抢救赢得时间。总之，气管异物是危急症之一，要抓紧时机，尽快急救方可成功。否则，便会危及生命或留下严重后遗症。更多信息请访问：百考试题护士网校 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com