

2010年心理护理：躁狂症的诊断标准护士资格考试 PDF转换
可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/1/2021_2022_2010_E5_B9_B4

[_E5_BF_83_c21_1223.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/1/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E5_BF_83_c21_1223.htm) 一、症状标准：以情绪高涨或易激惹为主要特征，且症状持续至少一周，在心境高扬期，至少有下列症状中的三项：1.言语比平时显著增多；来源

： www.examda.com 2.联想加快，或观念飘忽，或自感言语跟不上思维活动的速度；3.注意力不集中，或者随境转移；

<http://ks.100test.com> 4.自我评价过高，可达妄想程度；5.自我感觉良好，如感头脑特别灵活，或身体特别健康，或精力特别充沛；6.睡眠的需要减少，且不感疲乏；7.活动增多，或精神运动性兴奋；8.行为轻率或追求享乐，不顾后果，或具有冒险性；9.性欲明显亢进。二、严重程度标准，至少有下列情况之一：

1.工作、学习和家务劳动能力受损；来源：考试大 2.社交能力受损；3.给别人造成危险或不良后果。三、

排除标准：百考试题论坛 1.不符合脑器质性精神障碍、躯体疾病与精神活性物质和非依赖性物质所致精神障碍；2.可存在某些分裂性症状，但不符合精神分裂症的诊断标准。若同时符合精神分裂症的症状诊断标准，鉴别诊断可参考分裂情感性精神病的诊断标准。更多信息请访问：百考试题护士网校 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com