

2010年手术室护理：尿道上裂术后护理注意事项护士资格考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/1/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E6_89_8B_c21_1251.htm

有些孩子先天性生殖器就是畸形，这要是在古代，可能就是被称为怪物了。不过现代社会，这个没有关系，类似与尿道上裂这种，做手术解决即可。很多人可能不知道，尿道上裂会严重影响男性排尿功能甚至是生殖系统健康，所以家长们如果发现这类现象，一定要及时就医。患者应该注意，术后的护理也是至关重要的，本文就来系统的介绍一下尿道上裂术后的护理问题。第一，使用抗生素预防感染。来源：考试大 第二，尿道上裂手术后一周内拆线即可，术后10~12天拆除固定阴茎海绵体白膜的u型缝线。第三，尿道上裂手术后三四天内更换敷料。每次更换敷料时需清除尿道口的分泌物，并沿尿道由近侧向远侧轻轻挤压，以清除尿道内的分泌物。第四，十二岁以上尿道上裂手术后，一周内给予适量镇静剂及雌激素，防止阴茎勃起。来源：考试大 第五，如伤口愈合良好，可于术后9~12天夹闭膀胱造口管试行排尿。如创口感染愈合不良或部分裂开时则暂不排尿。经常清除尿道的分泌物，并作物理治疗，较小的瘻口常可自行愈合。如经3~4周的积极治疗，瘻孔仍不愈合，则拔除膀胱造口管，3~6月后再修补尿道瘻。来源

：www.examda.com 提示：尿道上裂患者一定要注意，尿道上裂手术成功率较低，而且疾病的治疗关系到患者未来的幸福，因此首先要注意选择正规医院进行手术，同时注意术后护理，争取早日恢复健康。最后，提醒家长们的是如果你发现你家小孩有尿道上裂症状，一定要及时就医，以免给小孩留

下心里阴影，及时治疗是关键。更多信息请访问：百考试题
护士网校 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详
细请访问 www.100test.com