

2010年内科护理：霍乱的一般治疗与护理护士资格考试 PDF  
转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/1/2021\\_2022\\_2010\\_E5\\_B9\\_B4\\_E5\\_86\\_85\\_c21\\_1265.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/1/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E5_86_85_c21_1265.htm) 按消化道传染病严密隔离隔离至症状消失6天后粪便弧菌连续3次阴性为止方可解除隔离病人用物及排泄物需严格消毒可用加倍量的20%漂白粉乳剂或2~3%来苏儿0.5%氯胺还可用新药84消毒液消毒病区工作人员须严格遵守消毒隔离制度以防交叉感染。来源:百考试题网 休息重型患者绝对卧床休息至症状好转。来源:百考试题网 饮食剧烈泻吐暂停饮食待呕吐停止腹泻缓解可给流质饮食在患者可耐受的情况下缓慢增加饮食。 水份的补充为霍乱的基础治疗轻型患者可口服补液重型患者需静脉补液待症状好转后改为口服补液。来源：www.examda.com 标本采集患者入院后立即采集呕吐物的粪便标本送常规检查及细菌培养注意标本采集后要立即送检。 密切观察病情变化每4小时测生命体征1次准确纪录出入量注明大小便次数量和性状。 更多信息请访问：百考试题护士网校 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)