

2010年内科护理：糖尿病并发症高渗性昏迷\_护士资格考试  
PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/1/2021\\_2022\\_2010\\_E5\\_B9\\_B4\\_E5\\_86\\_85\\_c21\\_1659.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/1/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E5_86_85_c21_1659.htm) 高渗性昏迷是一种常发生在老年2型糖尿病患者的急性并发症，在1型糖尿病病友身上比较少见，临床表现与酮症酸中毒相似，只是尿中没有酮体，少有酸中毒。由于血糖和血渗透压很高，患者很容易发生昏迷，一旦发病，死亡率也远比酮症酸中毒昏迷为高。处理和抢救的原则与糖尿病酮症酸中毒相近。高渗性昏迷的常见诱因百考试题(100test.com) \* 有糖尿病而毫无察觉，没有采取正规的治疗，甚至因其他疾病而误用高糖输液，致使血糖显著升高。 \* 应激：有感染、心绞痛或心肌梗塞、脑血管意外、外科手术等急性情况。 \* 老年人渴感减退，饮水中枢不敏感，而造成进水太少血液浓缩等等。高渗性昏迷的预防百考试题(100test.com) 和任何一种糖尿病急症一样，高渗性昏迷的预防极为重要，因为一旦发生，即对病人的生命构成极大的威胁。 \* 及时发现、正确治疗糖尿病 \* 平时注意都喝水，一定不要限制饮水 \* 规律生活、合理起居、注意锻炼 \* 老年患者得了小病要及时治疗防微杜渐 \* 任何不适时均应加强血糖监测。更多信息请访问：百考试题护士网校 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)