

2010年内科护理：腹部爆震伤的临床表现和诊断_护士资格考试_PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/1/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E5_86_85_c21_1718.htm

爆震伤（即冲击伤）是指冲击波击中生物体时释放出的能量而造成的各种损伤，冲击波作用于腹部引起腹部爆震伤是闭合性腹部外伤原因之一。爆震伤与一般创伤相似，但又有其特殊性，其特点是外轻内重（体表损伤轻而内脏损伤重），发展迅速（中度以上的冲击伤病情发展快），常发生多部位或多脏器伤。因此检查必须全面仔细，以免漏诊。冲击波可引起腹腔实质性脏器如肝脾破裂，腹腔脏器出血，严重者可造成肠管（主要是小肠下段和结肠）穿孔与膀胱破裂。来源：www.examda.com 发生腹腔脏器挫伤或破裂的伤员，可出现不同程度的腹痛、恶心呕吐、压痛、反跳痛和腹肌紧张等腹膜刺激征象；因腹腔内大出血或弥漫性腹膜炎可产生休克；肾脏和膀胱损伤时可发生血尿；肠粘膜损伤或肠穿孔时可出现血便；肠穿孔时在X线腹部透视中还可查出膈下游离气体；肝破裂时血清谷丙转氨酶（SGPT）活性增高，在伤后12小时达到伤前4~5倍；盆腔脏器损伤时可刺激直肠而有频繁的便意。腹部爆震伤根据受伤史和症状一般均可作出诊断。必要时进行腹腔穿刺，X线检查和化验检查以确定诊断。如不能确诊而又有怀疑时，应严密观察。更多信息请访问：百考试题护士网校 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com