

2010年外科护理：硬膜外及脑室引流的护理_护士资格考试_
PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/1/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E5_A4_96_c21_1746.htm 为清除神经外科术后患者硬膜外血肿，调整颅内压，通常放置硬膜外或脑室引流装置，在引流过程中，护理工作起着重要的作用。 一、护理重点（一）预防感染来源：www.examda.com 1.行CT检查或搬运患者时，要将引流回路临时夹紧，防止脑脊液倒流。 2.每天更换三通活栓部位的纱布，注意无菌操作，观察局部有无脑脊液或血液渗出，注意保持清洁卫生。 3.引流放置时间一般为10~14天，引流时间过长时，应定期更换回流或换到对侧引流，或改为脑室腹腔分流术。 二、约束患者 为保证安全引流管理，对意识不清的患者除适当使用镇静药物外，应适当采取约束措施。约束前，必须向患者及其家属说明约束的必要性，征得同意，以取得理解和配合。约束过程中，要做好护理记录，注明约束理由，制定护理计划，每换一班，都要进行评估。 更多信息请访问：百考试题护士网校 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com