

2010年儿科护理：儿科护理操作换血过程中的护理\_护士资格考试\_PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/1/2021\\_2022\\_2010\\_E5\\_B9\\_B4](https://www.100test.com/kao_ti2020/1/2021_2022_2010_E5_B9_B4)

[\\_E5\\_84\\_BF\\_c21\\_1860.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/1/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E5_84_BF_c21_1860.htm) 按常规行腹部皮肤消毒、铺巾，将硅胶管插入脐静脉，接上三通管，抽血测定血清胆红素及其他生化项目，测量静脉压后开始换血。 根据患儿体重，全身及心功能情况，每次换血量10~20ml，从少量开始逐渐增加到每次20ml，换血速度每分钟10ml。 每换血100ml，要测静脉压1次，高则多抽，低则少抽，保持静脉压的稳定。

如果使用血液抗凝剂为枸橼酸保养液，则每换100ml血后要缓慢推注10%葡萄糖酸钙1ml。 注射器内不能有空气，防止空气栓塞，换血过程中注射器必须经常用含肝素的生理盐水冲洗，防止凝血。 换血过程应注意保暖，密切观察病情变化，监测生命体征、出入量、静脉压及用药等，做好心电监护。监测血胆红素浓度。 更多信息请访问：百考试题护士网校 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)