

A类第五部分外科学(一)外科总论(3) PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/110/2021\\_2022\\_A\\_E7\\_B1\\_BB\\_E7\\_AC\\_AC\\_E4\\_BA\\_94\\_c73\\_110991.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/110/2021_2022_A_E7_B1_BB_E7_AC_AC_E4_BA_94_c73_110991.htm) 第十一章 外科感染 1

1、外科感染的发生，最重要的原因为 A、伤口的存在 B、致病菌入侵人体 C、局部组织血循环不良 D、未及时应用抗生素 E、贫血 2、全身化脓性感染中最严重者为 A、G-杆菌败血症 B、菌血症 C、脓血症 D、毒血症 E、G 细菌败血症 3、破伤风的发病是由于 A、伤口内有破伤风杆菌 B、全身缺乏免疫力 C、破伤风杆菌在伤口内生长繁殖 D、破伤风杆菌产生的外毒素 E、破伤风杆菌产生的内毒素 4、关于外科感染。下列哪项是错误的 A、需要外科治疗的感染 B、可由几种细菌引起混合感染 C、局部症状较明显 D、可引起局部病灶的化脓改变 E、不引起全身的严重感染 5、肢体出现压痛的“红线”，多考虑 A、丹毒 B、急性蜂窝织炎 C、浅部淋巴管炎 D、深部淋巴管炎 E、以上都不是 6、关于丹毒，下列哪项是错误的 A、多发生于下肢 B、病变皮肤发红、疼痛 C、病变境界清楚 D、形成脓肿 E、可复发 7、关于脓性指头炎的治疗，下列哪项是错误的 A、早期局部药物外敷 B、应用抗生素 C、局部肿痛剧烈需切开引流 D、切开引流经患指侧面纵切口 E、切开引流经患指掌面纵切口 8、破伤风发作的临床表现，下列哪项是错误的 A、发作可因轻微刺激而诱发 B、肌肉痉挛首先影响咀嚼肌 C、发作时面唇青紫，通气困难 D、发作时神志不清 E、可有尿潴留 9、关于破伤风治疗，下列哪项是错误的 A、一旦痉挛发作，伤口处理已无必要 B、早期使用抗毒素 C、交替使用镇静、解痉药 D、抽搐频繁、药物难以控制

患者，应作气管切开 E、应用大剂量青霉素 10、关于外科应用抗菌药物，下列哪项是正确的 A、所有外科感染都需应用抗菌药物 B、当手术时间较长，可在术中追加抗菌药一次剂量 C、术后常规应用抗菌药物7天 D、手术前后抗菌药物的应用可弥补无菌操作的不足 E、常规应用广谱抗生素 11、预防无菌切口感染的措施中，下列哪项是错误的 A、手术操作细致、准确 B、止血彻底 C、常规应用抗生素 D、避免死腔形成 E、无菌操作技术 12、面部“危险三角区”疖的危险性在于 A、引起颅内感染 B、引起鼻窦炎 C、引起眼球感染 D、容易发展成痈 E、治疗困难 13、丹毒病变是 A、急性淋巴管网炎症 B、急性淋巴管炎症 C、急性蜂窝织炎 D、多发疖肿 E、急性淋巴结炎并向周围扩散 14、对脓毒症病人进行血细菌培养，何时抽血可提高阳性率 A、高热时 B、高热后 C、寒战时 D、寒战后 E、预计寒战、发热前 答案 1、 B 2、 A 3、 D 4、 E 5、 C 6、 D 7、 E 8、 D 9、 A 10、 B 11、 C 12、 A 13、 A 14、 E

第十二章 创伤与战伤 1、有关损伤的急救和转运，下列哪项是错误的 A、外露骨折断端应及时复位 B、开放性伤口用无菌纱布覆盖。缠上绷带 C、四肢动脉大出血时可上止血带 D、脊柱骨折的伤员必须卧板床 E、已明确无颅脑及腹部内脏损伤而剧痛的患者，可注射止痛剂 2、有关健康肉芽组织的标准，下列哪项是错误的 A、创面平浅 B、创面鲜红色 C、创面呈细颗粒状 D、创面分泌物少 E、创面不易出血 3、损伤后体液代谢改变的调节主要是通过 A、增加K的排出量 B、增加H的排出量 C、增加CO<sub>2</sub>的排出量 D、减少NA的绝对排出量 E、减少尿的排出量 4、面颊部开放性损伤，受伤后12小时就诊，局部处理亦 A、做感染伤口处理，换药不清创 B、清创不缝合 C

、清创延期缝合 D、清创一期缝合 E、以上均不是 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问  
[www.100test.com](http://www.100test.com)