

A类第五部分外科学(一)外科总论(2) PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/110/2021_2022_A_E7_B1_BB_E7_AC_AC_E4_BA_94_c73_110997.htm

第六章 麻醉 1、下列哪类病人麻醉前病情分级(ASA)为Ⅰ级 A、病人心、肺、肝、肾和中枢神经系统功能正常，发育营养良好，能耐受手术和麻醉。 B、病人心、肺、肝、肾等实质器官病变严重，功能代偿不全，威胁生命安全，实施麻醉和手术有危险性。 C、病人心、肺、肝、肾等实质器官病变严重，虽在代偿范围，但施行手术和麻醉有一定危险性。 D、病人心、肺、肝、肾等实质器官轻度病变，但代偿健全，尚能耐受手术和麻醉。 E、病人生命垂危，麻醉和手术异常危险。 2、哪种药物麻醉属分离麻醉 A、硫喷妥钠 B、异丙酚 C、芬太尼 D、咪唑安定 E、氯胺酮 3、普鲁卡因的一次限量是 A、1g B、400mg C、60mg D、10mg / kg E、2mg / kg 4、毒性大不宜用于局部浸润麻醉的局麻药是 A、布比卡因 B、利多卡因 C、丁卡因 D、罗比卡因 E、普鲁卡因 5、病人仰卧时所处位置最低的椎体是 A、C3和L3 B、T5和S4 C、C2和L2 D、T2和L1 E、T12和S1 6、忌用腰麻的情况是 A、老年人 B、有高血压病史的病人 C、糖尿病 D、下肢骨折 E、休克 7、局麻药毒性反应的原因，以下哪项是错误的 A、一次用量超过病人的耐量 B、病人对局麻药的耐受力降低 C、药物误注入血管 D、局麻前未应用间托晶 E、注射部位血供丰富 8、饱食后急诊手术，对麻醉的主要不利影响是 A、腹胀不适 B、影响肺活量 C、麻药用量增大 D、影响腹部手术的操作 E、呕吐物误吸 9、全脊髓麻醉是硬膜外麻醉的严重并发症，下列哪项描述是错误的 A、硬膜

外阻滞所用麻醉药误入蛛网膜下腔 B、病人短时间内呼吸停止 C、发生后应以鼻导管给病人吸氧 D、应给予血管活性药物，维持有效血循环 E、预防措施是先给予试验剂量，确定无腰麻后再继续给药

10、全麻术前应用阿托品的作用之一是 A、镇静 B、缓解手术时对内脏的牵引疼痛 C、减少呼吸道黏液分泌 D、抗焦虑 E、改善微循环

11、指神经阻滞麻醉不宜加肾上腺素，原因是 A、有利药物吸收 B、可能增加毒性反应 C、可能引起指坏死 D、使心率增快 E、影响麻醉效果

12、监测呼吸功能的最佳指标是 A、呼吸频率 B、潮气量 C、每分钟通气量 D、动脉血氧分压和二氧化碳分压 E、唇、皮肤色泽

13、下列哪种麻醉方法术前可不用阿托品 A、气臂内插管全麻 B、氯胺酮麻醉 C、硬膜外麻醉 D、腰麻 E、指神经阻滞麻醉

答案 1、C 2、E 3、A 4、C 5、A 6、E 7、D 8、E 9、C 10、C 11、C 12、D 13、E

第七章 重症监测治疗与复苏

1、成人患者进行机械通气，选择辅助/控制通气模式，潮气量为 A、5~7ml/Kg B、7~10ml/Kg C、8~12ml/Kg D、10~15ml/Kg E、12~15ml/Kg

2、一旦确诊为心跳呼吸骤停，应争取在多长时间建立有效的呼吸和循环 A、3~4分钟 B、4~6小时 C、6~8小时 D、4~6分钟 E、6~8分钟

3、胸外心脏按压的部位 A、胸骨下1/3处 B、胸骨中1/3处 C、胸骨中、下1/3交界处 D、胸骨中、上1/3交界出 E、心前区

4、心肺复苏用药时首选药物是 A、心三联(肾上腺素、去甲肾上腺素和异丙肾上腺素) B、肾上腺素 C、异丙肾上腺素 D、去甲肾上腺素 E、利多卡因

5、口对口人工呼吸的操作，下列哪项是错误的 A、头后仰、托起下颌 B、吹气要看到胸廓抬起 C、每次吹气量800ml左右 D、吹气时捏闭鼻孔 E、吹气频

率20次 / 分钟左右 6、初期复苏阶段，单人复苏和双人复苏式心脏按压和口对口人工呼吸的比例分别是 A、15 : 1和5 : 1 B、5 : 1和15 : 2 C、15 : 2和5 : 2 D、15 : 2和5 : 1 E、5 : 1和15 : 2 答案 1、 D 2、 D 3、 C 4、 B 5、 E 6、 D 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com