

A类第四部分内科学(四)肾脏病学3 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/112/2021_2022_A_E7_B1_BB_E7_AC_AC_E5_9B_9B_c73_112942.htm 第五章 急性肾功能衰竭

1、急性肾功能衰竭患者，行非透析疗法阶段，观察补液量是否适中的指标为：A、每日体重不增加 B、皮下无脱水及水肿 C、血清钠浓度正常 D、中心静脉压测定 E、以上均是

2、上消化道大出血，出现低血压，经输血补液后虽血压正常，但出现少尿，考虑为急性肾功能衰竭，最有助于诊断的检查是：A、尿常规+比重 B、血常规 C、血肌酐 D、血电解质测定 E、血气分析

3、男。56岁，尿本周蛋白阳性，诊断为多发性骨髓瘤，24小时尿蛋白3g，B超左肾积水。下列哪一因素最易促发急性肾功能衰竭 A、糖皮质激素 B、细胞毒药物 C、碱性药物 D、静脉肾盂造影 E、大量补液

4、男。25岁，3天前食不洁食物后出现发热，腹泻水样便，每日10余次，伴恶心呕吐，口服抗生素治疗无效。体检：脱水貌，心率110次/分，血压14/10kPa，24小时尿量400ml，查血Bun 11.3mmol/l，Cr 187 μmol/l，尿比重1.022、尿钠131 mmol/l，初步诊断为：A、肾前性少尿 B、急性肾小管坏死 C、药物致急性肾功能衰竭 D、感染性休克 E、细菌内毒素致急性肾功能衰竭

5、急性肾功能衰竭少尿期高分解状态，最适合的营养治疗是：A、优质低蛋白饮食 B、高热量、低蛋白饮食 C、高蛋白、高热量、低盐饮食 D、补充必需氨基酸 E、全静脉营养疗法

6、急性肾功能衰竭少尿期，不常见水电解质紊乱为：A、水过多 B、高钾血症 C、低钾血症 D、低钙、高磷血症 E、低钠、低氧血症

7、急性肾功能衰竭透析指征下列哪项应除

外？ A、急性肾功能衰竭伴肺水肿 B、急性肾功能衰竭高钾血症 C、急性肾功能衰竭少尿2天 D、急性肾功能衰竭Bun>28.6mmol / l , Cr>442 μ mol / l E、有明显酸中毒或高分解代谢

8、急性肾功能衰竭进入多尿期，下列哪项最不可能出现？ A、脱水 B、血尿素氮及肌酐即可降至正常 C、低钾血症 D、上消化道出血 E、继发感染

答案 1、 E 2、 C 3、 D 4、 A 5、 E 6、 C 7、 C 8、 B

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com