

A类第四部分内科学(三)消化系统疾病6 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/112/2021\\_2022\\_A\\_E7\\_B1\\_BB\\_E7\\_AC\\_AC\\_E5\\_9B\\_9B\\_c73\\_112948.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/112/2021_2022_A_E7_B1_BB_E7_AC_AC_E5_9B_9B_c73_112948.htm) 第十章 原发性肝癌 1

1、原发性肝癌肝内转移最常见的途径：A、肝动脉 B、肝静脉 C、淋巴结 D、肝内胆管 E、肝门静脉 2、原发性肝癌肝外转移好发部位是：A、骨 B、脑 C、肾 D、肾上腺 E、肺 3、哪项指标是小肝癌定位的最好方法？A、B型超声波检查 B、放射性核素检查 C、Ct结合数字减影肝动脉造影 D、Ct检查 E、腹腔镜检查 4、诊断肝癌特异性最强的肿瘤标志物是：A、Afp B、ggt- C、Ap D、Akp E、Aif 5、下列哪项有助于鉴别肝癌和良性活动性肝病？A、hBsAg阳性 B、Afp阳性 C、Afp阴性 D、肝功能明显损害 E、Afp和Alt动态曲线 6、原发性肝癌的常见并发症为：A、肝性脑病 B、上消化道出血 C、肝癌结节破裂出血 D、继发感染 E、以上各项都对 7、排除其他疾病后Afp诊断原发性肝癌的标准是：A、Afp $>500 \mu\text{g} / \text{ml}$ 持续2周 B、Afp $>500 \mu\text{g} / \text{ml}$ 持续4周 C、Afp $>200 \mu\text{g} / \text{ml}$ 持续4周 D、Afp $>200 \mu\text{g} / \text{ml}$ 持续6周 E、Afp $>100 \mu\text{g} / \text{ml}$ 持续2周 8、对hBsAg阳性的人群作肝癌普查，首选的方法为：A、B超 + Afp B、B超 + Ct C、B超 + mri D、B超 + 肝动脉造影 E、Ct + 肝动脉造影 9、肝肿大患者于右上腹听到血管杂音首先应考虑：A、慢性活动性肝炎 B、肝硬化 C、原发性肝癌 D、心源性肝硬化 E、下腔静脉阻塞综合征 10、对原发性肝癌的诊断，下列哪项最准确？A、甲胎蛋白 B、超声波 C、血清 - 谷氨酰转肽酶 D、血清碱性磷酸酶测定 E、肝扫描 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

